

# بیش از ۳۴ میلیون مبتلا به کرونا در هند



شمار مبتلایان به بیماری «کویید-۱۹» در جهان تاکنون به ۲۳۹ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۴۲ نفر رسیده و مرگ چهار میلیون و ۸۸۲ هزار و ۱۰۴ نفر بر اثر ابتلا به این بیماری تأیید شده است و ۲۱۶ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۶۰۶ نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند. به گزارش اسپید، روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کویید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۱ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می‌گیرد.

بر اساس آمارهای جهانی، آمریکا با بیش از ۴۵.۴ میلیون مبتلا و بیش از ۷۳۷ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کویید-۱۹ قرار دارد. هند نیز با آمار بیش از ۳۴ میلیون مبتلا پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتلا قرار دارد و آمار مبتلایان به کویید-۱۹ در برزیل هم از ۲۱.۵ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ بالاترین شمار مبتلایان است. همچنین پس از ایالات متحده، کشورهای برزیل با بیش از ۶۰۱ هزار و هند با بیش از ۴۵۱ هزار جانباخته، بالاترین آمار قربانیان کویید-۱۹ را در این فهرست جهانی گزارش داده‌اند.

بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از آمار ۲۱۸ هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است.

همچنین ایران با مجموع پنج میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۸۵ ابتلا و ۱۲۳ هزار و ۸۱ مورد فوت ناشی از بیماری کویید-۱۹ در رتبه هشتم در بین ۱۰ کشور دارای بیشترین آمار مبتلایان کرونا قرار گرفته است. بنا بر جدول به روز شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ورلدامتر، شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش‌های رسمی بالاترین آمارها را تاکنون داشته‌اند تا صبح امروز (چهارشنبه) به ترتیب به شرح جدول است:

#	نام کشور	مجموع مبتلایان	مجموع قربانیان
۱	ایالات متحده	۴۵,۴۳۱,۱۶۷	۷۳۷,۵۸۹
۲	هند	۳۴,۰۰۱,۷۲۳	۴۵۱,۲۲۰
۳	برزیل	۲۱,۵۹۰,۰۹۷	۶۰۱,۴۴۲
۴	انگلیس	۸,۲۳۱,۴۳۷	۱۳۷,۹۴۴
۵	روسیه	۷,۸۳۲,۹۶۴	۲۱۸,۳۴۵
۶	ترکیه	۷,۵۰۸,۹۷۵	۶۶,۶۰۵
۷	فرانسه	۷,۰۶۳,۵۱۱	۱۱۷,۱۵۰
۸	ایران	۵,۷۲۹,۷۸۵	۱۲۳,۰۸۱
۹	آرژانتین	۵,۲۶۷,۳۳۹	۱۱۵,۵۴۷
۱۰	اسپانیا	۴,۹۱۷,۴۴۸	۸۶,۸۲۷

## نظر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در مورد دوز تقویتی واکسن کرونا

کارشناسان این سازمان همچنین اظهار داشتند: «افراد بالای ۶۰ سال که با دریافت واکسن‌های سینواک و سینوفارم به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شده‌اند، باید سومین دوز واکسن را تزریق کنند.»

گروه مشاوران راهبردی از متخصصان ایمن سازی (SAGE) تأکید کرد که تزریق دوز تقویتی برای کل جمعیت توصیه نمی‌شود و این در حالی است که در حال حاضر برخی از کشورها اقدام

به این کار کرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت خواهان توقف تزریق دوز سوم برای عموم مردم تا پایان سال است چرا که مردم کشورهای فقیر برای دریافت اولین دوز واکسن در اولویت هستند. به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، هدف این سازمان مبنی بر واکسیناسیون کامل ۱۰ درصد از جمعیت هر کشور تا پایان ماه سپتامبر (ماه گذشته میلادی) در ۵۶ کشور محقق نشد. هر چند، تقریباً ۹۰ درصد کشورهای پر درآمد به این هدف دست پیدا کردند. ■

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت (WHO) از تزریق دوز سوم واکسن کرونا ویروس به افرادی با سیستم ایمنی ضعیف حمایت کردند.

به گزارش اسپید، گروه مشاوران واکسن سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (دوشنبه) توصیه کردند: «افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند باید دوز سوم واکسن‌های کویید-۱۹ را که مورد تأیید این سازمان است، دریافت کنند.»

## توصیه جدید در باره مصرف آسپرین

گروه‌ای از متخصصان مرکز پزشکی تافتس در ایالات متحده بر اساس دستورالعمل‌های به روز شده اعلام کردند: «افراد مسن که به بیماری قلبی مبتلانیستند، نباید برای پیشگیری از بروز اولین حمله قلبی یا سکته مغزی به مصرف آسپرین اقدام کنند.»

به گزارش اسپید، این متخصصان در پیش‌نویس دستورالعمل‌های به روز شده اظهار داشتند: «افرادی که دچار بیماری قلبی نیستند لازم نیست برای جلوگیری از وقوع اولین مورد حمله قلبی یا سکته مغزی از دُر پایین آسپرین مصرف کنند.» به گفته متخصصان خطرات خونریزی در افراد ۶۰ ساله به بالا که سابقه سکته قلبی یا مغزی نداشته‌اند بیشتر از مزایای بالقوه مصرف قرص آسپرین است. برای اولین بار این

گروه است مصرف این دارو برای افراد ۴۰ ساله که خطر خونریزی آنان را تهدید نمی‌کند مزایای کمی داشته باشد. همچنین اطلاعات کافی در مورد مزایای مصرف این دارو در افراد سالم ۵۰ تا ۶۰ ساله وجود ندارد. این توصیه‌ها تنها برای افرادی است که دارای فشار خون بالا، کلسترول بالا، چاقی یا سایر بیماری‌هایی هستند که احتمال حمله قلبی یا سکته مغزی را در آنان افزایش می‌دهد. صرف نظر از سن، بزرگسالان باید با پزشک در مورد قطع یا شروع مصرف آسپرین مشورت کنند. به گزارش ایسنا به نقل از ژاین تودی، محققان بر این باورند: «استفاده از آسپرین می‌تواند آسیب‌های جدی ایجاد کند و با بالا رفتن سن این خطر افزایش می‌یابد.» ■

## آیاداروی جدید آسترانکامشابه واکسن آن عمل می‌کند؟

داروساز بریتانیایی اعلام کرد که داروی تجربی کویید-۱۹ آسترانکا به کاهش خطر ابتلا به بیماری شدید و مرگ‌ومیر کمک خواهد کرد و تلاش‌های خود را برای تولید داروهایی فراتر از واکسن افزایش داده است. این دارو که ترکیبی از دو آنتی‌بادی است، اولین دارو در نوع خود است که در مراحل پایانی آزمایش‌های بالینی به‌عنوان داروی پیشگیرانه و درمانی ارائه شده است. درمان با آنتی‌بادی که با تزریق انجام می‌شود، خطر ابتلا به کویید-۱۹ شدید یا مرگ را در بیماران غیربستری که علائم آنها به مدت ۷ روز یا کمتر است تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. این دارو برای محافظت از افراد در معرض خطر که واکنش ایمنی کافی در برابر واکسیناسیون فعلی ندارند، طراحی شده است. داروی جدید حاوی آنتی‌بادی‌های آزمایشگاهی است که برای ماه‌ها در بدن ماندگار شده و در صورت عفونت و ویروس مبارزه می‌کند و واکسن آسترانکا که در سراسر جهان استفاده می‌شود به یک سیستم ایمنی سالم متکی است تا آنتی‌بادی‌های هدفمند و سلول‌های مبارزه‌کننده با عفونت را ایجاد کند. این آزمایش در ۱۳ کشور انجام شد و بیش از ۹۰۰ فریبزرگسال در آن شرکت کردند. آسترانکا قبلاً از مقامات آمریکایی درخواست تأیید اضطراری کرده است تا بتواند از کوک‌آنتی‌بادی به‌عنوان یک درمان پیشگیرانه استفاده کند.

شرکت غول‌دارویی آمریکایی مرک نیز درخواست تأیید فوری قرصی را برای درمان بیماران مبتلا به عفونت خفیف تا متوسط کرده است و اگر تأیید شود، مولتوپیراویر، اولین داروی ضد ویروسی خوراکی این بیماری می‌شود و می‌توان این قرص را در خانه مصرف کرد. ■